

سپتیکول پلاس®

VETAL

سرم هایپرایمیون پلی کلونال علیه میکروب های انتخابی و بیماری های روده ای و تنفسی

ترکیب

سرم هایپرایمیون پلی کلونال می باشد که از سرم گاوهای تلقیح شده با واکسن های کشته باکتریایی و ویروسی به شرح ذیل تهیه شده است:

Salmonella typhimurium ; *Salmonella dublin* ; *Pasteurella multocida* ; *Mannheimia haemolytica* ; *Escherichia coli* (11 A & EC) ; *Clostridium perfringens* (Types A, B & C) ; *Coronavirus* ; *Rotavirus*

موارد مصرف

- سپتیکول پلاس ماوی آنتی بادی های پلی کلونال می باشد که پس از تلقیح می تواند ایمنی فوری، قدرتمند و غیرفعال وسیع الطیفی را در گوساله، بچه شتر، کره اسب، بره و بزغاله علیه عفونت های سالمونلا تیفی موریوم؛ سالمونلا دابلین؛ پاستورلا مولتوسیدا؛ مانهمیا همولیتیکا؛ ایکلای (سویه های 11 A & EC)؛ کلسترییدیوم پرفرنزنس (تایپ های A, B, C)؛ کرونا ویروس و روتاویروس مسبب بیماری های تنفسی و گوارشی ایجاد نماید.
- در نوزادان متولد شده مساس با سطح ایمنوگلوبولین نامعلوم، نوزادان متولد شده از سفت زایی ها و نیز نوزادان حاصل از اولین بارداری، استفاده از این محصول اکیدا توصیه می گردد.

میزان دز و نحوه مصرف

- پیش از مصرف، سرم را به دمای اتاق (15 تا 25 درجه سانتی گراد) رسانده و پس از مخلوط شدن کامل، مصرف نمایید.
- سرم را به روش زیر جلدی مطابق برنامه زیر تزریق نمایید:
- **پیشگیری (پروفاکسی):** سپتیکول پلاس را به میزان 10 میلی لیتر بلافاصله پس از تولد گوساله، بچه شتر و کره اسب تلقیح نمایید. میزان تزریق در بره و بزغاله، یک-سهم یا 3 میلی لیتر می باشد.
- **درمان:** سپتیکول پلاس را به میزان 20 تا 30 میلی لیتر به گوساله، بچه شتر و کره اسب تلقیح نمایید. میزان تزریق در بره و بزغاله، یک-سهم یا 7 تا 10 میلی لیتر می باشد.
- دوره ماندگاری ایمنیت غیرفعال پس از تلقیح سپتیکول پلاس 15 روز خواهد بود، لذا بمنظور حفظ تیتراژ آنتی بادی، هر 15 روز یکبار می توان تلقیح را تکرار نمود.
- استفاده همزمان سپتیکول پلاس با مواد درمانی دیگر مانند آنتی بیوتیک بلا مانع می باشد.

احتیاطات مصرف

- احتمال بروز ازدیاد مساسیت پس از تلقیح وجود دارد.
- تبصیت از شرایط آسپتیک در عملیات تلقیح توصیه می گردد.

هشدار

پس از اتمام مصرف، ویال استفاده شده یا فالی را مطابق شرایط توصیه شده بهداشتی معدوم نمایید.

زمان پرهیز از مصرف

در فصول محصولات بیولوژیک که تنها ماوی آنتی بادی ها می باشند، دوره پرهیز از مصرف وجود ندارد.

شرایط نگهداری و ممل و نقل

سرم را در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد، بدون نور فوشید و شرایط انجماد نگهداری و ممل نمایید.

بسته بندی و عمر قفسه ای

سپتیکول پلاس در ویال های 10، 20، 30، 50 و 100 میلی لیتری عرضه شده و در شرایط مطلوب نگهداری تا 2 سال از زمان تولید، اعتبار مصرف دارد.



مجموعه شرکت وتال ترکیه
نماینده انحصاری در ایران: شرکت رادین صنعت رایان

www.twora.ir

فقط برای مصارف دامپزشکی
تمت نظارت سازمان دامپزشکی کشور
IVC: 913990416129682



VETAL

SEPTICOL Plus[®]

POLYCLONAL HYPER - IMMUNE SERUM

Against

Selective Enteric and Respiratory Pathologic Conditions

Composition and Description:

Hyper-immune serum prepared from cattle hyper-immunized with inactivated *Salmonella* (*typhimurium* and *dublin*), *P. multocida*, *M. haemolytica*, *E.coli* (11A and EC), *Cl. perfringens* (types A, B & C), Coronavirus and Rotavirus.

Indications:

- SEPTICOL Plus contains polyclonal antibodies provide immediate, powerful and passive broad-spectrum protection in Calves (Cattle, Camel), Lambs, Kids & Foals against infection with *Salmonella* (*typhimurium* and *dublin*), *P. multocida*, *M. haemolytica*, *E.coli* (11A and EC), *Cl. perfringens* (types A, B & C), Coronavirus and Rotavirus caused enteric and respiratory pathologic conditions.
- It is highly recommended to use in susceptible newborn animals those with unknown immunoglobulin levels, those that have a difficult birth and those from first pregnancy.

Administration & Dosage

- Warming up in room temperature (15-25°C) and well mixed before use.
- The Polyclonal Hyper - Immune Serum administered subcutaneously (s.c.), immediately after birth.
- **Prophylaxis:** 10 ml for prevention in calves and foals (1/3 for lambs and kids OR 3 ml).
- **Treatment:** 20-30 ml for treatment in calves and foals (1/3 for lambs and kids OR 7-10 ml).
- As it gives immunity up to 15 days, to boost the level of antibodies, it can be re-administered every 15 days.
- Septicol Plus can be used in conjunction with other treatments, e.g. antibiotics.

Contraindications:

Unknown.

Precautions:

- Hypersensitivity reaction may occur following administration.
- Usual aseptic measures should be observed at the time of application.

Caution(s):

After completion of application, discard in appropriate way all the empty or partially used bottles.

Withdrawal Period:

Legal withdrawal periods do not apply to biological products which contain only antibodies.

Storage Conditions:

Store out of direct sunlight and at a temperature between 2°C and 8°C. Do not freeze.

Shelf-Life:

24 months after production date under recommended storage conditions.

Presentation:

The vaccine packed in bottles of 10, 20, 30, 50 and 100 ml.



Animal Health Products S.A.

📍 Petrolsob Mah.14.Cad. No:1/1 Adiyaman /TURKEY

☎ +90 416 223 20 30

☎ +90 416 223 14 56

✉ vetal@vetal.com.tr

🌐 www.vetal.com.tr